

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ИНГУШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

ХИМИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра химии

СОГЛАСОВАН

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель образовательной программы

И.о. декана химико-биологического

_____ профессор Саламов А.М.

факультета _____ М.К.Дакиева

« 22 » _____ мая _____ 2024 г.

« 23 » _____ мая _____ 2024 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине

«ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ»

Направление подготовки/специальность: 04.03.01 Химия

Уровень образования: бакалавриат

Фонд оценочных средств

разработал _____ Саламов А.М., профессор, к.п.н.

Утвержден на заседании кафедры химии

протокол заседания № 10 от « 21 » мая 2024 г.

Зав. кафедрой _____ А.М.Саламов

Магас, 2024

1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ ДИСЦИПЛИНОЙ

Код компетенции	Наименование компетенции	Индикатор достижения компетенции	В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
<i>Универсальные компетенции и индикаторы их достижения</i>			
УК-1	Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие;	Знать: <ul style="list-style-type: none"> - понятие и классификация систем; - структуру и закономерности функционирования систем; - особенности системного подхода в научном познании; - понятие о системе, её целях, задачах и общих принципах; - основные технологии поиска и сбора информации; - форматы представления информации в компьютере; - правила использования средств связи; - информационно-поисковые системы и базы данных; - технологию осуществления поиска информации; - технологию систематизации полученной информации; - способы статистической обработки данных, представленных в различных измерительных шкалах и анализ полученных результатов; - виды и формы работы с педагогической и научной литературой; - требования к оформлению библиографии (списка литературы). Уметь: <ul style="list-style-type: none"> - работать с информацией, представленной в различной форме; - обрабатывать данные средствами стандартного программного обеспечения; - синтезировать информацию, представленную в различных
		УК-1.2. Определяет, интерпретирует и ранжирует информацию, требуемую для решения поставленной задачи;	
		УК-1.3. Осуществляет поиск информации для решения поставленной задачи по различным типам запросов;	
		УК-1.4. При обработке информации отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок, формирует собственные мнения и суждения, аргументирует свои выводы и точку зрения;	
		УК-1.5 Рассматривает и предлагает возможные варианты решения поставленной задачи, оценивая их достоинства и недостатки.	

			<p>источниках; -</p> <ul style="list-style-type: none"> - выбирать источники информации, адекватные поставленным задачам и соответствующие научному мировоззрению; - осуществлять поиск информации; - интерпретировать и ранжировать информацию, требуемую для решения поставленной задачи. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - персональным компьютером и поисковыми сервисами; - методиками аналитико-синтетической обработки информации из различных информационно-поисковых систем (предметизация, аннотирование, реферирование).
Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения			
ОПК-1	Способен анализировать и интерпретировать результаты химических экспериментов, наблюдений и измерений	ОПК-1.1. Использует теоретические основы неорганической, органической, физической аналитической химии для анализа и интерпретации результатов химического эксперимента;	<p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - описывать, систематизировать и анализировать результаты химических экспериментов, наблюдений, делать выводы; - решать задачи с применением основных законов химии; - решать задачи с использованием различных способов выражения концентраций вещества в растворе; - составлять ионно-электронные схемы окислительно-восстановительных процессов, протекающих в растворах; - описывать пространственную конфигурацию молекул, ионов и комплексных соединений на основе метода валентных связей; - строить энергетические диаграммы молекул и ионов, определять порядок связи в них и их магнитные свойства на основе метода молекулярных орбиталей; - рассчитывать тепловые эффекты химических реакций, значения термодинамических функций
		ОПК-1.2. Применяет методы наблюдения, классификации, воспроизводства химических объектов в лабораторных условиях; использует полученные знания для различного химического анализа	
		ОПК-1.3. Умеет выбирать метод исследования, методику проведения экспе-	

		<p>римента в соответствии с поставленными задачами, планировать химический эксперимент, прогнозировать результаты эксперимента, анализировать и интерпретировать полученные экспериментальные результаты, описывать полученные результаты.</p>	<p>систем;</p> <ul style="list-style-type: none">- рассчитывать окислительно-восстановительные потенциалы и ЭДС гальванических элементов <p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none">- современную номенклатуру основных классов неорганических соединений;- основные законы химии; основные положения теории строения атома;- современные подходы к описанию химической связи (основы метода валентных связей и метода молекулярных орбиталей);- различные способы выражения содержания вещества в растворах;- основные понятия окислительно-восстановительных процессов и электро-химии;- основные положения современных теорий растворов электролитов и неэлектролитов; основы термохимии, химической кинетики; основные положения теории комплексных соединений
		<p>ОПК-1.4 Владеет навыками проведения химического эксперимента, основными синтетическими и аналитическими методами получения и исследования химических веществ и реакций.</p>	<p>Владеть:</p> <p>навыками проведения химического эксперимента, основными синтетическими и аналитическими методами получения и исследования химических веществ и реакций.</p>
Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения			
ПК-11	Способен использовать методы отбора материала, проводить теоретические занятия и лабораторные работы, основы управления процессом обучения в образовательных организациях.	<p>ПК-11.1. Проводит анализ требований федеральных государственных образовательных стандартов; знает основы методики преподавания, виды и приемы современных педагогических технологий;</p>	<p>Знать:</p> <p>содержание нормативных документов, содержание государственного стандарта, действующих программ и учебников, технологии обучения химии;</p> <ul style="list-style-type: none">- содержание преподаваемых дисциплин, теории и технологии обучения и воспитания, методы контроля, оценки и диагностики результатов обучения химии;- содержание
		<p>ПК-11.2.</p> <p>Разрабатывает и реализует программы</p>	

		учебных дисциплин в рамках основной общеобразовательной программы;	<p>программ и методику преподавания химии (в соответствии с направленностью (профилем) программы бакалавриата, магистратуры; систему знаний, умений и компетенций в соответствии с ФГОС ВО, учебными планами и рабочими программами химических дисциплин;</p> <p>- систему материальных средств обучения и оборудования, используемых для преподавания химии в профессиональных учебных заведениях;</p> <p>- методику составления учебных и рабочих программ по химии;</p> <p>- принципы планирования и условия применения традиционных и нетрадиционных технологий обучения: лекции, семинары, лабораторные и практические занятия, зачеты, деловые игры, модульную систему обучения и др.;</p> <p>- современные и инновационные технологии преподавания химии;</p> <p>- принципы управления процессом обучения;</p> <p>- принципы отбора материала для использования в научно-педагогической деятельности.</p> <p>Уметь:</p> <p>- отбирать учебный материал и конструировать содержание в соответствии заданными целями и задачами химического образования;</p> <p>- использовать разнообразные методы, формы, средства диагностики, мониторинга, контроля, измерения и оценки учебных достижений учащихся;</p> <p>- проектировать образовательный процесс с применением современных технологий, соответствующих особенностям возрастного развития личности;</p>
		ПК-11.3. Планирует учебные занятия и самостоятельную работу учащихся; владеет формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки учебных занятий: проектная деятельность, лабораторные эксперименты, практика и т.п.;	
		ПК-11.4. Выстраивает индивидуальные образовательные маршруты по дисциплине;	
		ПК-11.5. Реализует программы учебных дисциплин и оценивает результаты собственной деятельности.	

			<p>определять цель и учебно-воспитательные задачи изучения учебного материала;</p> <ul style="list-style-type: none"> - составлять учебные программы, пособия и другие дидактические материалы; - отбирать химический эксперимент в соответствии с целями обучения и учетом техники безопасности его проведения; - осуществлять контроль за усвоением знаний и корректировать процесс обучения; - использовать разнообразные методы, формы, средства диагностики, мониторинга, контроля, измерения и оценки достижений сотрудников; - использовать на практике умения в организации научно-исследовательской работы и работы в научном коллективе, способности реализовывать новые идеи и проекты. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - современными информационными технологиями, способами ориентации и профессиональных источниках информации (журналы, сайты, образовательные порталы); - техникой и методикой химического эксперимента; - методами отбора материала и основами управления процессом обучения; - техникой и методикой химического эксперимента с учетом безопасности его проведения.
--	--	--	--

2. Оценивание выполнения практических заданий

4-балльная шкала (уровень освоения)	Показатели	Критерии
Отлично (повышенный уровень)	1. Полнота выполнения практического задания; 2. Своевременность выполнения задания; 3. Последовательность и рациональность выполнения задания;	Студентом задание решено самостоятельно. При этом составлен правильный алгоритм решения задания, в логических рассуждениях, в выборе формул и решении нет ошибок, получен верный ответ, задание решено рациональным способом.
Хорошо (базовый уровень)	4. Самостоятельность решения; 5. и т.д.	Студентом задание решено с подсказкой преподавателя. При этом составлен правильный алгоритм решения задания, в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок; правильно сделан выбор формул для решения; есть объяснение решения, но задание решено нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок, получен верный ответ.
Удовлетворительно (пороговый уровень)		Студентом задание решено с подсказками преподавателя. При этом задание понято правильно, в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущены существенные ошибки в выборе формул или в математических расчетах; задание решено не полностью или в общем виде.
Неудовлетворительно (уровень не сформирован)		Студентом задание не решено.

3. Оценивание ответа на экзамене

4-балльная шкала (уровень освоения)	Показатели	Критерии
Отлично (повышенный уровень)	1. Полнота изложения теоретического материала; 2. Полнота и правильность решения практического задания; 3. Правильность и/или	Студентом дан полный, в логической последовательности развернутый ответ на поставленный вопрос, где он продемонстрировал знания предмета в полном объеме учебной программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе отвечает на дополнительные вопросы, приводит

	аргументированность изложения (последовательность действий);	собственные примеры по проблематике поставленного вопроса, решил предложенные практические задания без ошибок.
Хорошо (базовый уровень)	4. Самостоятельность ответа; 5. Культура речи; 6. и т.д.	Студентом дан развернутый ответ на поставленный вопрос, где студент демонстрирует знания, приобретенные на лекционных и семинарских занятиях, а также полученные посредством изучения обязательных учебных материалов по курсу, дает аргументированные ответы, приводит примеры, в ответе присутствует свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается неточность в ответе. Решил предложенные практические задания с небольшими неточностями.
Удовлетворительно (пороговый уровень)		Студентом дан ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой дисциплины, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием основных вопросов теории, слабо сформированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить примеры, недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа и решении практических заданий.
Неудовлетворительно (уровень не сформирован)		Студентом дан ответ, который содержит ряд серьезных неточностей, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и последовательности. Выводы поверхностны. Решение практических заданий не выполнено. Т.е студент не способен ответить на вопросы даже при дополнительных наводящих вопросах преподавателя.

4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ

ВОПРОСЫ К СЕМИНАРСКОМУ ЗАНЯТИЮ № 1

План занятия:

1. Предмет дисциплины «Химические основы биологических процессов».
2. Особенности живой материи.
3. Клетка, как структурная и функциональная единица живого организма
4. Особенности поведения органических соединений *in vivo*.
5. Особенности протекания процессов *in vivo*.
6. Методы исследования природных соединений.

Задачи для решения

1. Размеры клеток и их компонентов

а) Если увеличить клетку в 10 000 раз (такое увеличение обычно достигается в электронном микроскопе), то какого размера она стала бы? Предположите, что вы рассматриваете «типичную» эукариотическую клетку с диаметром 50 мкм.

б) Если вы рассматриваете мышечную клетку (миоцит), сколько в ней содержится молекул актина? (Считайте, что клетка имеет сферическую форму и не содержит никаких других компонентов; молекулы актина имеют сферическую форму и диаметр 3,6 нм; объем сферы равен $(4/3)\pi R^3$.)

в) Если вы рассматриваете клетку печени (гепатоцит) таких же размеров, сколько в ней может содержаться митохондрий? (Считайте, что клетка имеет сферическую форму и не содержит никаких других компонентов; митохондрии имеют сферическую форму и диаметр 1,5 мкм.)

г) Глюкоза служит основным источником энергии для большинства клеток. Принимая внутриклеточную концентрацию глюкозы равной 1 мМ (т. е. 1 миллимоль/л), рассчитайте число молекул глюкозы, содержащихся в нашей гипотетической эукариотической клетке (сферической формы). (Число Авогадро, равное числу молекул в 1 моле неионизированного вещества, составляет $6,02 \cdot 10^{23}$.)

2. Компоненты клетки *E. coli*.

Клетки *E. coli* имеют форму цилиндра высотой 2 мкм и диаметром 0,8 мкм. Объем цилиндра вычисляется по формуле $\pi R^2 h$, где h – высота цилиндра.

а) Сколько весит одна клетка *E. coli*., если ее плотность (в основном за счет воды) равна в среднем $1,1 \cdot 10^3$ г/л?

б) Толщина защитной клеточной оболочки *E. coli*. равна 10 нм. Какую долю (в процентах) общего объема бактерии составляет клеточная оболочка?

в) *E. coli*. быстро растет и размножается благодаря тому, что в ее клетке присутствует около 15000 сферических рибосом (диаметр рибосомы 18 нм),

осуществляющих синтез белков. Какая часть общего объема клетки приходится на долю рибосом?

3. Генетическая информация в ДНК *E. coli*.

Содержащаяся в ДНК генетическая информация определяется линейной последовательностью кодирующих единиц, называемых кодонами. Каждый кодон представляет собой специфическую последовательность трех нуклеотидов (трех пар нуклеотидов в двухцепочечной ДНК) и соответствует одному аминокислотному остатку в белке. ДНК *E. coli* имеет очень большую молярную массу — около $3,1 \cdot 10^9$ г/моль. Средняя молярная масса пары нуклеотидов равна 660 г/моль, а вклад каждой пары нуклеотидов в длину молекулы ДНК составляет 0,34 нм.


а) Используя эти данные, рассчитайте длину молекулы ДНК *E. coli*. Сравните длину молекулы ДНК с размерами клетки (задача 2). Каким образом ДНК помещается в клетке?

б) Подсчитайте, чему равно максимальное число белков, которое может быть закодировано в молекуле ДНК *E. coli*, если предположить, что белковая молекула состоит в среднем из 400 аминокислот.

4. Быстрый транспорт в аксонах. Нейроны имеют длинные тонкие отростки, называемые аксонами. Аксоны обеспечивают передачу сигнала в нервной системе организма. Некоторые аксоны могут достигать длины до 2 м, например аксоны, отходящие от спинного мозга и заканчивающиеся в мышцах пальцев ног. Маленькие заключенные в мембрану частицы, переносящие важные для работы аксонов вещества, движутся вдоль микротрубочек цитоскелета от центра клетки до окончаний аксонов. Если среднюю скорость движения частицы принять равной 1 мкм/с, то сколько времени понадобится такой частице (везикуле), чтобы пройти от центра клетки в спинном мозге до окончания аксона в пальцах ног?

5. Витамин С: отличается ли искусственный витамин С от натурального? Некоторые поставщики обогащенных витаминами пищевых продуктов заявляют, что витамины, полученные из природных источников, полезнее для здоровья, чем синтезированные искусственным путем. Например, считается, что чистая L-аскорбиновая кислота (витамин С) из плодов шиповника полезнее чистой L-аскорбиновой кислоты, синтезированной на химическом производстве. Различаются ли витамины из этих двух источников? Может ли организм различить витамины из разных источников?


6. Активность лекарственных веществ и стереохимия. В некоторых случаях количественные различия в биологической активности двух энантиомеров одного и того же вещества выражены достаточно сильно. Например, D-изомер изопротеренола (применяется при легких приступах астмы) действует в качестве бронхорасширяющего средства в 50–80 раз сильнее, чем L-изомер. Укажите хиральный центр в молекуле изопротеренола. Почему два энантиомера так сильно различаются по биологической активности?



7. Действие лекарственных препаратов и форма молекул. Несколько лет назад

две фирмы выпустили в продажу препарат под торговыми названиями декседрин и бензедрин. Структурная формула этого вещества приведена на рисунке.


Но физическим свойствам (содержанию С, Н и N, температуре плавления, растворимости и др.) оба препарата идентичны. Тем не менее рекомендованная доза декседрина (он до сих пор выпускается) составляла 5 мг/сут., а рекомендованная доза бензедрина (снят с производства) была вдвое выше. Таким образом, для достижения одного и того же физиологического эффекта бензедрина требуется гораздо больше, чем декседрина. Объясните это кажущееся противоречие.




8. Строительные блоки сложных биомолекул.

На рисунках показаны структура наиболее важных компонентов сложных биомолекул. Укажите строительные блоки, из которых состоят три изображенные ниже важные биологические биомолекулы (показаны в ионной форме, соответствующей физиологическому значению pH).


а) Гуанозинтрифосфат (GTP) — энергетически богатая молекула, нуклеотид, входящий в состав РНК:



б) Фосфатидилхолин — компонент многих мембран:



в) Метэнкефалин (энкефалин, содержащий в пятом положении метионин) — природный опиат мозга:



9. Определение структуры биомолекулы.

Из мышц кролика выделили неизвестное вещество X. Его структура была установлена на основании следующих наблюдений и экспериментов. Результаты качественного анализа показали, что вещество содержит только углерод, водород и кислород. Взвешенный образец вещества X был подвергнут полному окислению, после чего определены количества образовавшихся H_2O и CO_2 . Исходя из данных этого анализа было сделано заключение, что массовая доля C, H и O в веществе X составляет соответственно 40,0, 6,71 и 53,29%. Молекулярная масса вещества X в соответствии с данными масс-спектрометрии оказалась равной 90,0 а.е.м. Метод инфракрасной спектроскопии показал, что в молекуле X есть одна двойная связь. Вещество X легко растворяется в воде, образуя кислый раствор. При исследовании этого раствора с помощью поляриметра было установлено, что X обладает оптической активностью.

а) Определите эмпирическую и молекулярную формулы X.

б) Нарисуйте возможные структуры вещества X, которые удовлетворяли бы молекулярной формуле и имели одну двойную связь. Рассмотрите только линейные или разветвленные структуры, не принимая во внимание циклические структуры. Учтите, что атомы кислорода с трудом образуют связи между собой.

в) Какое значение для структуры молекулы имеет оптическая активность вещества? Какие структуры, предложенные вами в пункте (б), соответствуют этому наблюдению?

г) Какое значение для структуры молекулы имеет тот факт, что при растворении вещества X образуется кислый раствор? Какие структуры, предложенные вами в пункте (б), соответствуют этому наблюдению?

д) Каково строение вещества X? Совместимо ли со всеми имеющимися данными существование нескольких структур?

ВОПРОСЫ К СЕМИНАРСКОМУ ЗАНЯТИЮ № 2

План занятия:


1. Аминокислоты. Классификация. Строение.
2. Особенности строения α -аминокислот. Протеиногенные аминокислоты.
3. Изoeлектрическая точка аминокислот.
4. методы исследования аминокислот.
5. Особенности протекания процессов *in vivo* с участием аминокислот.

Задачи для решения

1. Ионные формы аланина

Аланин – двухосновная кислота, способная претерпевать две реакции диссоциации (значения рКш см. в табл. 3-1).


а) Пользуясь приведенной ниже структурой частично протонированной формы аланина, изобразите химическую структуру двух других форм аланина, преобладающих в водном растворе: полностью протонированную и полностью депротонированную формы.



Какая из трех форм присутствует в наибольшей концентрации в растворах со следующими значениями pH: б) 1,0; в) 6,2; г) 8,02; д) 11,9?

2. Абсолютная конфигурация цитруллина

Какую конфигурацию (D или L) имеет выделенный из арбуза цитруллин, формула которого приведена на рисунке? Поясните свой ответ.



3. Разделение аминокислот методом ионообменной хроматографии

Анализ смеси аминокислот начинают с разделения этой смеси на компоненты с помощью ионообменной хроматографии. После нанесения на колонку с катионообменной смолой, содержащей группы $-\text{SO}_3^-$ (рис.), аминокислоты движутся вниз по колонке с разной скоростью, поскольку на их движение оказывают влияние два фактора:

1) притяжение между $-\text{SO}_3^-$ группами носителя и положительно заряженными функциональными группами аминокислот; 2) гидрофобные взаимодействия между боковыми цепями аминокислот и сильно гидрофобной полистиреновой основой носителя. Для каждой из приведенных ниже пар аминокислот определите, какая аминокислота будет сходить с колонки первой при промывании колонки буфером с pH 7,0.


а) Asp и Lys

б) Arg и Met

в) Glu и Val


г) Gly и Leu

д) Ser и Ala



4. Обозначение стереоизомеров изолейцина

Структурная формула аминокислоты изолейцина изображена ниже.



- Сколько хиральных центров имеет молекула изолейцина?
- Сколько оптических изомеров может быть у изолейцина?
- Нарисуйте пространственные формулы для всех оптических изомеров изолейцина.

5. Сравнение значений pK_a аланина и полиаланина

Кривая титрования аминокислоты аланина отражает наличие двух ионизируемых функциональных групп с pK_a 2,34 и 9,69, что отвечает соответственно ионизации карбоксильной и протонированной аминогруппы. Кривые титрования ди-, три- и олигопептидов аланина также демонстрируют наличие только двух ионизируемых групп, хотя их экспериментально определенные значения pK_a отличаются от pK_a функциональных групп аланина (см. табл.).

Аминокислота или пептид	pK_1	pK_2
Ala	2,34	9,69
Ala-Ala	3,12	8,30
Ala-Ala-Ala	3,39	8,03
Ala-(Ala) _n -Ala, n > 4	3,42	7,94

а) Нарисуйте структурную формулу Ala-Ala Ala. Укажите функциональные группы в этой молекуле, которым соответствуют pK_1 и pK_2 .

б) Почему с добавлением каждого следующего остатка аланина значение pK_1 возрастает?

в) Почему с добавлением каждого следующего остатка аланина значение pK_2 снижается?

6. Размеры белков

Чему приблизительно равна молекулярная масса белка, состоящего из 682 аминокислотных остатков, соединенных в единственную полипептидную цепь?

7. Число остатков триптофана в бычьем сывороточном альбумине

Количественный анализ аминокислот показал, что бычий сывороточный альбумин (БСА) содержит 0,58% (по массе) триптофана ($M_r = 204$).

а) Рассчитайте минимальную молекулярную массу БСА (т. е. считайте, что в молекуле белка содержится только один остаток триптофана).

б) В соответствии с результатами гельфильтрации молекулярная масса БСА равна 70 000. Сколько остатков триптофана содержится в его молекуле?

8. Определение последовательности пептида лейэнкефалина, выделенного из мозга

Из нормальной мозговой ткани была выделена группа пептидов, влияющих на передачу нервного импульса в некоторых отделах мозга. Эти пептиды называют опиоидами, поскольку они связываются со специфическими рецепторами, с которыми также связываются опиаты (алкалоиды опиума), такие как морфин и налоксон. Таким образом, опиоиды имитируют некоторые свойства опиатов. Некоторые ученые рассматривают эти вещества как содержащиеся в мозге собственные средства обезболивания. Используя приведенные ниже данные, определите аминокислотную последовательность опиоида лейэнкефалина. Объясните, как предложенная вами структура согласуется с каждым из результатов (а-в).

а) Полный гидролиз под действием 6 М HCl при 110 °C с последующим анализом аминокислот показал наличие в смеси Gly, Leu, Phe и Tug в молярном соотношении 2 : 1 : 1 : 1.


б) Хроматографический анализ, проведенный после обработки пептида 1-фтор-2,4-динитробензолом и полного гидролиза, выявил наличие 2,4-динитрофенильного производного тирозина. При этом свободного тирозина обнаружено не было.

в) Полное расщепление пептида под действием пепсина и проведенное затем хроматографическое разделение показали наличие дипептида, содержащего остатки Phe и Leu, и трипептида, содержащего Tug и Gly в соотношении 1 : 2.

9. Структура полипептидного антибиотика, выделенного из *Bacillus brevis*

Экстракты, полученные из бактериальной культуры *Bacillus brevis*, содержат пептид, обладающий свойствами антибиотика. Этот пептид образует комплексы с ионами металлов и, по-видимому, нарушает систему ионного транспорта через клеточную мембрану у других видов бактерий, что приводит к их гибели. Структуру пептида установили на основании приведенных ниже результатов.


а) Полный кислотный гидролиз полипептида с последующим анализом аминокислот продемонстрировал наличие эквимольных количеств Leu, Orn, Phe, Pro и Val. Orn – это сокращенное обозначение аминокислоты орнитина, не встречающейся в белках, но присутствующей в некоторых пептидах. Орнитин имеет такую структуру:



б) Молекулярная масса пептида оказалась приблизительно равна 1200.

в) Пептид не подвергался гидролизу при обработке ферментом карбоксипептидазой. Этот фермент катализирует отщепление любых С-концевых остатков, за исключением остатка Pro, а также за исключением тех случаев, когда остаток по какой-либо причине не содержит свободной карбоксильной группы.

г) Обработка исходного пептида 1-фтор-2,4-динитробензолом с последующим полным гидролизом и хроматографическим разделением показали наличие только свободных аминокислот и производного следующего строения:



(Подсказка: учтите, что 2,4-динитрофенильная группа присоединена не как обычно к атому азота, а к аминогруппе боковой цепи.)

д) Частичный гидролиз пептида, хроматографическое разделение продуктов и их аминокислотный анализ выявили наличие ди- и трипептидов следующего строения (аминоконцевые остатки всегда расположены слева):



Используя данную информацию, определите аминокислотную последовательность пептидного антибиотика. Поясните ваши рассуждения. Объясните, как предложенная вами структура согласуется со всеми экспериментальными данными.

ВОПРОСЫ К СЕМИНАРСКОМУ ЗАНЯТИЮ № 3

План занятия:

1. Белки. Классификация. Строение.
2. Первичная структура пептидов и белков.
3. Вторичная структура пептидов и белков.
4. Третичная и четвертичная структура белков.
5. Методы исследования строения белков.
6. Методы синтеза белков.

ЗАДАЧИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ

1. Свойства пептидной связи

При рентгеноструктурном анализе кристаллических пептидов Лайнус Полинг и Роберт Кори обнаружили, что связь C–N пептидной группы по длине (1,32 Å) занимает промежуточное положение между типичными одинарными C–N (1,49 Å) и двойными C=N (1,27 Å) связями. Кроме того, они установили, что пептидная группа имеет плоскую конфигурацию, т. е. все четыре атома, присоединенные к C–N-группе, лежат в одной плоскости, причем два атома углерода, связанные с C–N-группой, всегда находятся в *транс*-положении по отношению друг к другу, по разные стороны от пептидной связи.

а) Какой вывод относительно прочности и кратности пептидной связи (является ли она одинарной, двойной или тройной) можно сделать, исходя из ее длины?

б) Что можно сказать о возможности вращения вокруг пептидной C–N-связи на основании данных Полинга и Кори?

2. Связь структуры и функции фибриллярных белков

Уильям Астбери первым обнаружил, что рентгенограмма шерсти указывает на наличие структурной единицы волокна, повторяющейся с интервалом около 5,2 Å. Рентгенограмма шерсти, растянутой после обработки паром, указывала на наличие периодической структуры, повторяющейся через каждые 7,0 Å. После того как растянутая при обработке паром шерсть возвращалась в свое исходное состояние, структурная единица вновь повторялась с периодичностью 5,2 Å. Хотя эти наблюдения послужили ключом к пониманию молекулярной структуры шерсти, в то время Астбери не смог их интерпретировать.

а) Исходя из современных данных о структуре шерсти, объясните результаты экспериментов Астбери.

б) Если шерстяные вещи стирать в горячей воде или сушить горячим воздухом, они садятся, а с шелком в подобных условиях ничего не происходит. Объясните это явление.

3. Скорость синтеза α -кератина волос

Волосы растут со скоростью 15–20 см в год. Зона роста находится у основания волоса, где в клетках эпидермиса синтезируются и скручиваются нити α -кератина (рис. 4-10). Основным структурным элементом α -кератина является α -спираль, виток которой имеет шаг 5,4 Å и содержит 3,6 аминокислотных остатка (рис. 4-4, б). Считая, что лимитирующим фактором роста волос является биосинтез спиралей кератина, рассчитайте скорость образования пептидных связей α -кератина (число пептидных связей в секунду), которая обеспечивает наблюдаемый рост волос.



4. Дисульфидные связи определяют свойства многих белков

В молекулах ряда природных белков содержится много дисульфидных связей, причем механические свойства белков (прочность на разрыв, вязкость, твердость и др.) коррелируют с числом дисульфидных связей. Например, богатый дисульфидными мостиками белок пшеницы глутенин определяет вязкость и эластичность теста, приготовленного из пшеничной муки. Точно так же твердый и прочный панцирь черепахи обязан своими свойствами сети дисульфидных связей в молекулах α -кератина.

а) Какова молекулярная основа наблюдаемой связи между числом дисульфидных мостиков

и механическими свойствами белков?


б) Большинство глобулярных белков денатурируют и теряют активность при кратковременном нагревании до 65 °С. Но для денатурации глобулярных белков, содержащих несколько дисульфидных связей, обычно требуется более длительное нагревание при более высокой температуре. Примером может служить бычий панкреатический ингибитор трипсина, имеющий одну полипептидную цепь из 58 аминокислотных остатков и содержащий три дисульфидных мостика. Если этот белок денатурировать нагреванием, а затем охладить, то его активность восстанавливается. Какова молекулярная основа данного явления?

5. Бактериородопсин — белок пурпурной мембраны

При благоприятных внешних условиях бактерия *Halobacterium halobium*, обитающая в соленых водоемах, синтезирует мембранный белок бактериородопсин ($M_r = 26000$), имеющий пурпурную окраску благодаря содержащемуся в нем ретиналю. Молекулы этого белка образуют в клеточной мембране агрегаты в виде «пурпурных заплаток». Бактериородопсин действует как активируемый светом протонный насос и снабжает клетки энергией. Рентгеноструктурный анализ белка показал, что он состоит из семи параллельно расположенных α -спиральных участков, каждый из которых пересекает мембрану бактериальной клетки (толщина мембраны 45 Å). Определите минимальное число аминокислотных остатков, необходимое для образования α -спирального участка, способного полностью пронизывать мембрану. Оцените долю аминокислотных остатков бактериородопсина, задействованных в образовании α -спиралей (считайте, что средняя молекулярная масса аминокислотного остатка равна 110).

6. Число полипептидных цепей в олигомерном белке

Образец ($m = 660$ г) олигомерного белка с $M_r = 132000$ обработали избытком 2,4-динитрофторбензола в слабощелочной среде до завершения химической реакции. Затем пептидные связи белка подвергли полному гидролизу под действием соляной кислоты при нагревании. В гидролизате обнаружено 5,5 мг вещества следующего строения:



Никаких других 2,4-динитрофенильных производных аминокислот не было обнаружено.

- Объясните, как на основании данной информации можно определить число полипептидных цепей в олигомерном белке.
- Определите число полипептидных цепей белка.
- Какие другие методы анализа помогли бы вам определить, являются ли полипептидные цепи данного белка идентичными или различаются?

ВОПРОСЫ К СЕМИНАРСКОМУ ЗАНЯТИЮ № 4

План занятия:

- Моносахариды. Классификация. Строение.
- Стереохимия моносахаридов.
- Особенности химических свойств моносахаридов.
- Биохимия процессов, протекающих с участием моносахаридов.


ЗАДАЧИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ

1. Сахароспирты

В сахароспиртах (производных моносахаридов) кислород карбонильной группы восстановлен до образования гидроксильной группы. Например, D-глицеральдегид можно восстановить до глицерина. Однако последний не обозначают с помощью букв D или L. Объясните, почему.

2. Точка плавления озаонов — производных моносахаридов

Многие углеводы реагируют с фенилгидразином ($C_6H_5NHNH_2$) с образованием ярко-желтых кристаллических производных, называемых озаонами:



Температуру плавления этих веществ легко определяют и используют для характеристики каждого из них. Это свойство использовали при идентификации моносахаридов до появления высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) и газожидкостной хроматографии. Ниже приведены температуры плавления ($T_{пл}$) некоторых озаоновых производных альдоз.

Моносахарид	$T_{пл}$ моносахарида, °C	$T_{пл}$ озаона, °C
Глюкоза	146	205
Манноза	132	205
Галактоза	165–168	201
Талоза	128–130	201

Как видно из таблицы, определенные пары производных имеют одинаковые температуры плавления, хотя исходные моносахариды различались по этому параметру. Почему глюкоза и манноза, а также галактоза и талоза образуют озаоны с одинаковыми температурами плавления?

3. Взаимопревращения форм D-глюкозы

Один стереоизомер моносахарида, раствор которого вращает плоскость поляризации света влево (против часовой стрелки), называется левовращающим и обозначается (–); второй стереоизомер, который вращает плоскость поляризации света вправо (по часовой стрелке), называется правовращающим и обозначается (+). Эквимольные смеси обеих форм не вращают плоскость поляризации проходящего сквозь них света.

Оптическая активность стереоизомера количественно выражается в терминах оптического вращения, т. е. определяется числом градусов, на которое поворачивается плоскость поляризации света после прохождения через раствор с заданной концентрацией и заданной толщиной слоя.

Удельное вращение ($[\alpha]_D^{25^\circ C}$) оптически активного вещества определяется по формуле:

$$[\alpha]_D^{25^\circ C} = \frac{\text{наблюдаемое оптическое вращение } (^\circ)}{\text{длина оптического пути (дм)} \times \text{концентрация (г/мл)}}$$

При этом следует указывать температуру раствора и длину волны падающего света (обычно это D-линия Na, т. е. 589 нм).

Свежеприготовленный раствор α -D-глюкозы имеет величину оптического вращения $+112^\circ$. С течением времени оптическое вращение постепенно снижается и достигает равновесного значения $[\alpha]_D^{25^\circ C} = +52,5^\circ$. Напротив, свежеприготовленный раствор (α -D-глюкозы характеризуется значением оптического вращения $+19^\circ$. Оптическое вращение этого раствора со временем увеличивается и достигает того же равновесного значения.

а) Нарисуйте проекционные формулы Хеуорса для α - и (β -форм D-глюкозы. В чем состоит основное различие между ними?

б) Объясните, почему при хранении раствора α -формы величина оптического вращения уменьшается? Почему растворы α - и (β -форм D-глюкозы в одинаковых концентрациях постепенно приходят к одинаковому значению оптического вращения?

в) Рассчитайте процентное содержание обеих форм D-глюкозы в состоянии равновесия.

4. Конфигурация и конформация

Какие связи в молекуле α -D-глюкозы должны быть разорваны, чтобы молекула приняла конфигурацию β -D-глюкозы? Какие связи нужно разорвать, чтобы превратить D-глюкозу в D-маннозу?

5. Структура моносахаридов

Перечислите общие структурные черты и различия для каждой пары веществ: а) целлюлоза и гликоген; б) D-глюкоза и D-фруктоза; в) мальтоза и сахароза.

6. Вкус меда

Фруктоза, входящая в состав меда, главным образом находится в виде β -D-пиранозы. Это один из самых сладких известных углеводов: сладость фруктозы в два раза превышает сладость глюкозы. Фруктоза в форме β -D-фуранозы гораздо менее сладкая. При нагревании меда его сладость постепенно снижается. Кроме того, кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы (коммерческий продукт, в котором большая часть глюкозы превращена во фруктозу) используют для придания сладости холодным, но не горячим напиткам. Какое химическое свойство фруктозы лежит в основе этих наблюдений?

7. Восстанавливающие дисахариды

Дисахарид, являющийся либо мальтозой, либо сахарозой, обрабатывают раствором Фелинга. Образуется красная окраска. Какой дисахарид был в растворе? Объясните свой ответ.

8. Использование глюкозооксидазы для определения уровня глюкозы в крови

Фермент глюкозооксидаза из плесневого гриба *Penicillium notatum* катализирует окисление β -D-глюкозы до D-глюконо- δ -лактона. Этот фермент катализирует реакцию только (β -аномера, но не влияет на α -аномер. Несмотря на эту специфичность, реакция с глюкозооксидазой обычно используется в клинической практике для определения общего содержания глюкозы в крови, представляющей собой смесь α - и β -глюкозы. Почему это возможно? Какие еще преимущества, кроме возможности определять низкие концентрации глюкозы, имеет глюкозооксидазный метод определения глюкозы по сравнению с методом Фелинга?

9. Аномеры сахарозы

Лактоза существует в виде двух аномеров, а вот аномерных форм сахарозы обнаружено не было. Почему?

10. Гентиобиоза

Гентиобиоза (D-Glc(β 1 \rightarrow 6) D-Glc) — это дисахарид, встречающийся в некоторых растительных гликозидах. Изобразите структуру этого соединения. Является ли это вещество восстанавливающим сахаром? Подвергается ли оно мутаротации?

ВОПРОСЫ К СЕМИНАРСКОМУ ЗАНЯТИЮ № 5

План занятия:

1. Липиды. Классификация. Строение.
2. Роль липидов в формировании клеточных мембран.
3. Алкалоиды. Основы классификации.

ЗАДАЧИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ

1. Обсуждение термина «липиды»

Что такое «липид»? Чем липиды отличаются от других биомолекул — аминокислот, нуклеиновых кислот и белков?

2. Приготовление соуса Bearnaise

Во время приготовления соуса Bearnaise яичные желтки вбиваются в расплавленное масло, чтобы стабилизировать соус и избежать разделения фаз. Стабилизирующим агентом в яичном желтке является лецитин (фосфатидилхолин). Предположите, почему он так действует.

3. Структура омега-6 жирной кислоты

Изобразите структуру омега-6 жирной кислоты 16:1.

4. Каталитическое гидрирование растительных масел

Каталитическое гидрирование, используемое в пищевой промышленности, приводит к превращению двойных связей жирных кислот в связи $-\text{CH}_2-\text{CH}_2-$. Как это изменение влияет на физические свойства масел?

5. Нестабильность триацилглицеридов в щелочной среде

Общепринятой процедурой для очистки жируловителя в раковине является добавление средств, содержащих гидроксид натрия. Объясните, почему они так действуют.

6. Гидролиз липидов

Назовите продукты мягкого гидролиза разбавленным NaOH а) 1-стеароил-2,3-дипальмитоил глицерина; б) 1-пальмитоил-2-олеилфосфатидилхолина.

7. Влияние полярности на растворимость

Расположите следующие соединения в порядке увеличения растворимости в воде:


триацилглицерин; диацилглицерин и моноацилглицерин, причем все они содержат только пальмитиновую кислоту.

8. Алкалоиды – это наркотики?


Дайте подробный ответ на вопрос. Обоснуйте.

9. Активность теофиллина и теобромина

Охарактеризуйте биологическую активность алкалоидов теофиллина и теобромина. Напишите схему азольной таутомерии для теофиллина. Обладает ли азольной таутомерией теобромин? Свой ответ поясните. Напишите для него схему лактам-лактимной таутомерии.



Теобромин



Теофиллин

10. Никотин

Охарактеризуйте строение, биологическую активность и распространение в природе никотина.

11. Реакции никотина

Напишите уравнение реакции окисления никотина оксидом хрома (VI), если при этом образуется никотиновая кислота.

12. Кофеин

Охарактеризуйте строение, биологическую активность и распространение в природе кофеина. Подвергается ли кофеин лактам-лактимной и азольной таутомерии? Свой ответ поясните.

ПРИМЕР КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 1

1. Строение клетки. а) Если увеличить клетку в 10 000 раз (такое увеличение обычно достигается в электронном микроскопе), то какого размера она стала бы? Предположите, что вы рассматриваете «типичную» эукариотическую клетку с диаметром 50 мкм.
б) Если вы рассматриваете мышечную клетку (миоцит), сколько в ней содержится молекул актина? (Считайте, что клетка имеет сферическую форму и не содержит никаких других компонентов; молекулы актина имеют сферическую форму и диаметр 3,6 нм; объем сферы равен $(4/3)\pi R^3$.)
в) Если вы рассматриваете клетку печени (гепатоцит) таких же размеров, сколько в ней может содержаться митохондрий? (Считайте, что клетка имеет сферическую форму и не содержит никаких других компонентов; митохондрии имеют сферическую форму и диаметр 1,5 мкм.)
г) Глюкоза служит основным источником энергии для большинства клеток. Принимая внутриклеточную концентрацию глюкозы равной 1 мМ (т. е. 1 миллимоль/л), рассчитайте число молекул глюкозы, содержащихся в нашей гипотетической эукариотической клетке (сферической формы). (Число Авогадро, равное числу молекул в 1 моле неионизированного вещества, составляет $6,02 \cdot 10^{23}$.)

2. Сколько различных дипептидов можно получить, используя только глицин и аланин? Напишите схему превращений.
3. Определите строение сложного эфира α -аминокислоты, если известно, что он содержит 15,73% азота по массе.
4. Гемоглобин взаимодействует с кислородом с образованием комплекса, в котором на 4 моль кислорода приходится 1 моль гемоглобина. Вычислите число молекул гемоглобина, необходимое для переноса 1 мл кислорода (н.у.).
5. Дисахарид, являющийся либо мальтозой, либо сахарозой, обрабатывают раствором Фелинга. Образуется красная окраска. Какой дисахарид был в растворе? Объясните свой ответ.
6. Какие связи в молекуле α -D-глюкозы должны быть разорваны, чтобы молекула приняла конфигурацию β -D-глюкозы? Какие связи нужно разорвать, чтобы превратить D-глюкозу в D-маннозу?

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

Примерные задания теста №1

1 Покажите последовательность реакций витка спирали β -окисления жирных кислот:

- 1 - образование ацил-КоА и ацетил-КоА;
- 2 - образование еноил-КоА;
- 3 - образование β -кетацил-КоА;
- 4 - образование β -оксиацилКоА.

2. Один цикл спирали β -окисления включает 4 последовательных реакции, выберите правильную последовательность:

- 1 - Окисление, дегидрирование, окисление, расщепление.
- 2 - Восстановление, дегидрирование, восстановление, расщепление.
- 3 - Дегидрирование, гидратация, дегидрирование, расщепление.
- 4 - Гидрирование, дегидратация, гидрирование, расщепление.

3. Сравните процесс β -окисления и биосинтеза жирных кислот:

- | | |
|---------------------------------------|---|
| А – Биосинтез жирных кислот. | 1 Процесс имеет циклический характер. |
| Б – β -окисление жирных кислот. | 2 Используется кофермент НАД. |
| В – Оба процесса. | 3 Используется кофермент НАДФН ₂ . |
| Г – Ни один из них. | 4 Используется цитрат как субстрат реакций. |

Примерные задания теста №2

1 Биологическими функциями белков являются:

- 1) транспортная
- 2) каталитическая

- 3) защитная
- 4) генетическая

2 Функция белка гемоглобина:

- 1) запасает кислород в мышцах 2) переносит кислород к тканям
- 3) синтезирует кислород в клетках 4) расходует кислород в организме

3 Гидролиз белков – это:

- 1) разрушение вторичной и третичной структуры белков
- 2) то же самое, что и денатурация белков
- 3) необратимое разрушение структуры белков с образованием аминокислот

4 В результате гидролиза сложных белков образуются:

- 1) аминокислоты 2) аммиак 3) вода 4) небелковые компоненты

5 Денатурация белков – это:

- 1) разрушение третичной структуры белков
- 2) разрушение третичной и вторичной структуры белков
- 3) разрушение третичной, вторичной и первичной структуры белков

Примерные задания теста №3

1 Какую функцию выполняют ферменты в живых организмах?

- 1) питательную 2) защитную 3) каталитическую 4) транспортную

2 Отличия ферментов от небиологических катализаторов заключаются:

- 1) обладают специфичностью действия 2) менее активны, чем небиологические катализаторы 3) проявляют высокую активность при умеренной температуре

3 В основе классификации ферментов используется:

- 1) химическая природа фермента
- 2) химическая природа субстрата
- 3) тип катализируемой реакции
- 4) механизм действия фермента

4 При гидролизе ферменты распадаются на:

- 1) белки
- 2) аминокислоты
- 3) небелковые компоненты
- 4) аммиак

5 С повышением температуры активность ферментов:

- 1) повышается 2) понижается 3) не изменяется

Критерии оценки тестовых заданий:

– от 81% до 100% правильных ответов из общего числа предъявленных тестовых заданий студенту выставляется оценка ”отлично”;

– от 51% до 80% правильных ответов из общего числа предъявленных тестовых заданий студенту выставляется оценка ”хорошо”;

– от 31% до 50% правильных ответов из общего числа предъявленных тестовых заданий

студенту выставляется оценка ”удовлетворительно”;

от 0% до 30% правильных ответов из общего числа предъявленных тестовых заданий студенту выставляется оценка ”неудовлетворительно”.

Темы рефератов

1. Энергетическая ценность жиров.
2. Механизм действия лизоцима и α -химотриисина.
3. Важнейшие мутагены, токсикология основных реагентов для орг. синтеза.
4. Искусственная и синтетическая пища: проблемы и перспективы.
5. Ферменты как важнейшие биомолекулы ФАВ.
6. Современные представления об абзимах.
7. Типы молекулярных и межмолекулярных взаимодействий в биомолекулах.
8. Современные представления о структуре и функциях гена.
9. Гормоны – важнейшие регуляторы процессов метаболизма.
10. Механизмы действия эндорфинов и энкефалинов.
11. Проблема транс-изомеров жирных кислот.
12. Химия биологически активных соединений на рубеже столетий.
13. Алкогольная зависимость: биохимические причины.
14. Моделирование ферментативных процессов.
15. Витамины и микронутриенты.
16. Теории возникновения и развития жизни
17. Строение и структура глобулярных белков
18. Строение и структура фибриллярных белков
19. Ферменты, участвующие в расщеплении аминокислот
20. Генная инженерия. Успехи и проблемы
21. Химический и ферментативный синтез полинуклеотидов
22. Витамины незаменимые органические компоненты пищи
23. Молибден, ванадий и никель как компоненты некоторых ферментов
24. Биологическое значение ионов кальция, хрома, олова и алюминия
25. Химия дыхания
26. Химия иммунитета
27. Химия нейроэндокринной регуляции
28. Химия зрения
29. Химия мышечного сокращения
30. Стимуляторы роста растений
31. Гормоны
32. Химические функции компонентов клетки.
33. Переваривание и всасывание пищи.
34. Нобелевские лауреаты в области биохимии и медицины
35. Биологические активные добавки (БАД)
36. Генетически модифицированные продукты. Опасности. Перспективы
37. Антиоксиданты в живых организмах
38. Стволовые клетки. Перспективы
39. Синтез в организме жиров и родственных соединений
40. Синтез в организме глюкозы (глюконеогенез)

Критерии оценивания реферата

Оценка **«отлично»** выставляется, если работа студента написана грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, точка зрения студента обоснованна, в работе присутствуют ссылки на нормативно-правовые акты, примеры из судебной практики, мнения известных учёных в данной области. Студент в работе выдвигает новые идеи и трактовки, демонстрирует способность анализировать материал.

Оценка **«хорошо»** выставляется, если работа студента написана грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, точка зрения студента обоснованна, в работе присутствуют ссылки на нормативно-правовые акты, примеры из судебной практики, мнения известных учёных в данной области.

Оценка **«удовлетворительно»** выставляется, если студент выполнил задание, однако не продемонстрировал способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения, допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа.

Оценка **«неудовлетворительно»** выставляется, если студент не выполнил задание, или выполнил его формально, ответил на заданный вопрос, при этом не ссылаясь на мнения учёных, не трактовал нормативно-правовые акты, не высказывал своего мнения, не проявил способность к анализу, то есть в целом цель реферата не достигнута.

Вопросы к экзамену

1. Аминокислоты. Физико-химические свойства. Стереохимия. Белковые и непротеиногенные аминокислоты. Заменяемые и незаменимые аминокислоты.
2. Аминокислоты как структурные элементы белков.
3. Пептиды, структура и свойства. Стереохимия. Определение концевых аминокислотных остатков. Фрагментация пептидных цепей.
4. Химический и ферментативный синтез пептидов. Твердофазный пептидный синтез.
5. Автоматические пептидные синтезаторы.
6. Структурные аналоги природных пептидов.
7. Белки. Молекулярная масса, размер и форма белковых макромолекул. Методы выделения белков. Классификация белков.
8. Первичная структура белков и методы ее определения. Семейства белков и гомология первичной структуры.
9. Вторичная структура белков и методы ее определения. Пептидная связь и конформация полипептидной цепи. Основные типы вторичной структуры белков. Роль водородных связей.
10. Третичная структура белков. Рентгеноструктурный анализ биополимеров. Глобулярные и фибриллярные белки. Гидрофобные взаимодействия. Денатурация и ренатурация белков как кооперативные процессы. Связь третичной и первичной структур. Структура и функция глобинов. Миоглобин. Гемоглобин. Белки плазмы крови и их использование в медицине.
11. Четвертичная структура олигомерных белков. Природа взаимодействий. Стехиометрия. Биологическое значение олигомерных взаимодействий.
12. Химическая модификация белков. Простые и сложные белки. Апопротеины и простетические группы. Нуклео-, липо-, глико-, хромо-, фосфо-, металлопротеиды. Серповидноклеточная анемия как пример «молекулярной болезни». Химическая сущность мутаций. Наследственные нарушения обмена веществ.

13. Функции белков в организме. Ферменты. Гормоны. Транспортные белки. Антитела. Биотоксины. Антибиотики. Ингибиторы и активаторы ферментов. Агонисты и антагонисты рецепторов. Элементы теории фармакокинетики.
14. Моносахариды – олигосахариды – полисахариды. Важнейшие семейства моносахаридов. Стереохимия. Химические реакции. Биологически важные производные моносахаридов.
15. Олигосахариды. Структура и свойства. Важнейшие дисахариды и трисахариды. Полисахариды. Структура, классификация, свойства. Биологическое значение. Резервные и структурные полисахариды. Нуклеозиды – нуклеотиды – нуклеиновые кислоты. Структуры нуклеозидов. Пиримидиновые и пуриновые основания. Углеводные компоненты. Конфигурация гликозидного центра. Химические реакции.
16. Мононуклеотиды. Структура, номенклатура. Классификация. Стереохимия. Химические свойства. Биологически важные производные мононуклеотидов. Мононуклеотиды как структурные элементы нуклеиновых кислот. Полинуклеотиды и нуклеиновые кислоты
17. Классификация и номенклатура. Фосфодиэфирная связь. ДНК и РНК. Первичная структура нуклеиновых кислот. Секвенирование. Химические и ферментативные превращения полинуклеотидов. Вторичная структура нуклеиновых кислот, двойная спираль ДНК. Комплементарные и межплоскостные взаимодействия нуклеиновых оснований. Полиморфизм двойной спирали ДНК. Макромолекулярная структура РНК. Структура тРНК. Химический и ферментативный синтез полинуклеотидов. Автоматический твердофазный синтез. Функции полинуклеотидов в живых организмах.
18. Нуклеопротеиды. Вирусы и вирусные болезни. – фосфолипиды Жиры. Структура, номенклатура и классификация. Нейтральные ацилглицериды. Воска. Стероиды. Терпены. Простагландины. Тромбоксаны. Фосфолипиды. Структура, номенклатура, классификация. Фосфоглицериды. Химические превращения фосфолипидов. Сфинголипиды и гликолипиды. Липидные мицеллы. Липопротеиды. Молекулярные компоненты биомембран и функции биомембран. Клеточные стенки бактерий. Пенициллин и родственные антибиотики.
19. Витамины. Номенклатура и классификация. Жирорастворимые и водорастворимые витамины. Витамины как компоненты коферментов. Тиамин. Рибофлавин. Никотинамид. Пантотеновая кислота. Пиридоксин и пиридоксальфосфат. Антагонисты пиридоксальфосфат-зависимых ферментов как яды и лекарства. Изоникотинилгидразид в лечении туберкулеза. Биотин. Фолиевая кислота. Липокислота. Кобаламин. Аскорбиновая кислота. Витамины А, Д, Е и К как производные изопрена. Биологическая роль витаминов. Авитаминозы (цинга, рахит, пеллагра, анемии, берибери) и их лечение.
20. Витамины и микроэлементы. Микроэлементы. Роль ионов железа, меди, цинка, марганца и кобальта в биологических процессах. Биохимия и токсикология селена и бора. Молибден, ванадий и никель как компоненты некоторых ферментов. Биологическое значение ионов кальция, хрома, олова и алюминия. Кремний как микроэлемент. Особая роль ионов щелочных металлов в биологических системах.
21. Ферменты. Номенклатура, классификация. Белковая природа ферментов. Активный центр. Участок связывания с субстратом. Кофакторы ферментов. Коферменты и простетические группы. Холофермент и апофермент.
22. Кинетическая схема и уравнение Михаэлиса. Стационарная, предстационарная и релаксационная кинетика. Автокаталитические ферментные процессы. Скорости элементарных стадий. Кинетика инактивации и денатурации ферментов. Элементарные акты ферментативных реакций в рамках теории переходного

- состояния. Субстратная специфичность ферментов. Конкурентные и неконкурентные ингибиторы.
23. Каталитические свойства ферментов. Кинетика реакций ферментативного катализа. Механизмы ферментативных реакций. Регуляция активности ферментов. Влияние ионов водорода и ионов металлов. pH-Зависимости ферментативных реакций. Зависимость скорости реакций от температуры.
 24. Регуляторные ферменты. Аллостерические ферменты и модуляторы. Проферменты. Изоферменты. Мутации и активности ферментов.
 25. Молекулярные механизмы действия ферментов. Гидролазы: пепсин, химотрипсин, карбоксилаза, пирофосфатаза. Применение ферментов и их ингибиторов в медицине. Инженерная энзимология. Источники ферментов. Химическая модификация, иммобилизация и стабилизация ферментов, иммобилизованные клетки.
 26. Метаболизм. Обмен веществ и биоэнергетика. Термодинамическая обеспеченность биопроцессов. Метаболизм как совокупность процессов анаболизма и катаболизма. Источники углерода, кислорода, азота и водорода для жизнедеятельности организмов. Амфиболические процессы. Автотрофы и гетеротрофы. Стадии метаболизма.
 27. Неидентичность катаболических и анаболических путей. Уровни регуляции метаболизма. Метод изотопных меток в изучении метаболизма. Гликолиз и его стадии. Брожение и дыхание. Спиртовое брожение. Другие типы брожения.
 28. Цикл трикарбоновых кислот. Гелоксилатный цикл. Фосфоглюконатный путь.
 29. Окислительное фосфорилирование. Причина ядовитости мышьяка. Окисление жирных кислот. Окислительное расщепление аминокислот.
 30. Биосинтез углеводов, липидов, аминокислот, моонуклеотидов. Тимидилат-синтетаза как мишень в химиотерапии рака.
 31. Фотосинтез. Биоэнергетика и роль АТФ. Локализация и свойства АТФ. Стандартная свободная энергия гидролиза АТФ. Аденилатная система. Роль ионов магния. Пути ферментативного переноса фосфатных групп. Роль АТФ и пирофосфата. Механизм окислительного фосфорилирования и фотосинтеза. Элементы термодинамики открытых систем. Химия биологической фиксации азота атмосферы. Нитрогеназы. Азот-фиксирующие организмы и сельское хозяйство.
 32. Биополимеры и наследственность. Генетическая функция ДНК. Хромосомы. Прокариоты и эукариоты. Репликация ДНК. Ферменты биосинтеза ДНК. Транскрипция: биосинтез РНК на ДНК.
 33. Ферменты транскрипции. Регуляция экспрессии генов при инициации транскрипции. Опероны. Операторы. Репрессоры. Активаторы. Трансляция. Генетический код и функции тРНК.
 34. Свойства генетического кода. Кодированные элементы. Состав кодирующих триплетов.
 35. Кодон-антикодоновые взаимодействия. Аминоацил-тРНК-синтетазы. Рибосомы и биосинтез белков. Структура рибосом. Самосборка рибосом.
 36. Этапы биосинтеза белков. Инициация. Элонгация. Терминация. Энергетика биосинтеза белков. Регуляция биосинтеза белков.
 37. Генная инженерия. Выделение генов и получение кДНК. Полимеразная цепная реакция. Векторы. Молекулярные механизмы мутагенеза. Мутагенез генов и белковая инженерия.
 38. Генная инженерия и биотехнология. Генно-инженерные интерферон, гормон роста, инсулин. Экологические и этические проблемы генной инженерии. Гены и геномика. Геном человека.

39. Молекулярные аспекты дыхания человека. Химия дыхания. Гемоглобин как переносчик кислорода. Взаимодействия субъединиц гемоглобина и кооперативность процесса связывания кислорода. Мутантные гемоглобины и заболевания крови.
40. Химия иммунитета. Иммунный ответ. Структура антител. Иммуноглобулины. Легкие и тяжелые цепи. Вариабельные и инвариантные участки. Антигены. Комплексы антиген – антитело. В- и Т-лимфоциты. Комплемент и его компоненты. Иммунодефициты. Проблема СПИДа.
41. Химия нейроэндокринной регуляции. Нейроны. Синапсы. Нейромедиаторы. Ацетилхолин и ацетилхолинэстераза. Ингибиторы ацетилхолинэстеразы. Химия нервной передачи. Нейропаралитические яды. Нейропептиды. Энкефалины. Эндорфины. Опиоидные пептиды.
42. Эндокринные железы и гормоны. Химическая структура гормонов. Стероидные гормоны коры надпочечников и половых желез. Адреналин и норадреналин. Молекулярные действия гормонов. Аденилатциклазная система. Рецепторы.
43. Химия зрения. Сетчатка и фоторецепторы. Зрительные пигменты. Родопсин. Фотоизомеризация ретиналя. Люмиродопсин и метародопсины. Фотоиницирование нервного импульса.
44. Химия мышечного сокращения. Миозин. Актин. Актомиозиновый комплекс. АТФ-азная активность миозина. Сопряжение возбуждения и сокращения. Роль ионов магния, кальция и сульфгидрильных групп.
45. Химия активного трансмембранного переноса. Структура и функции биомембран.
46. Системы активного переноса против градиента концентрации. Роль ионов натрия и калия. АТФ-азная система. Натриевый насос. Активный перенос аминокислот и сахаров.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

По дисциплине: Химические основы биологических процессов

1. Аминокислоты. Физико-химические свойства. Стереохимия. Белковые и непротеиногенные аминокислоты. Заменяемые и незаменимые аминокислоты.
2. Микроэлементы. Роль ионов железа, меди, цинка, марганца и кобальта в биологических процессах.
3. Эндокринные железы и гормоны. Химическая структура гормонов. Стероидные гормоны коры надпочечников и половых желез. Адреналин и норадреналин.

Билет обсужден и утвержден на заседании кафедры _____

Заведующий кафедрой

А.М. Саламов

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2

По дисциплине: Химические основы биологических процессов

1. Белки. Молекулярная масса, размер и форма белковых макромолекул. Методы выделения белков. Классификация белков.

2. Ферменты. Номенклатура, классификация. Белковая природа ферментов. Активный центр. Участок связывания с субстратом. Кофакторы ферментов. Коферменты и простетические группы. Холофермент и апофермент.

3. Генная инженерия и биотехнология. Генно-инженерные интерферон, гормон роста, инсулин. Экологические и этические проблемы генной инженерии. Гены и геномика. Геном человека.

Билет обсужден и утвержден на заседании кафедры _____

Заведующий кафедрой

А.М. Саламов

**Методические материалы, определяющие процедуры
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций**

Для допуска к экзамену необходимо принять участие не менее чем 50% семинарских занятий, выполнение всех лабораторных работ и представление отчетов по ним. При подготовке к семинарским занятиям необходимо воспользоваться материалами учебной литературы, конспектами лекций

На лабораторном занятии каждый студент выполняет в соответствии с прописями указанными в методических руководствах по проведению лабораторных работ. На основании выполненной лабораторной работы студент оформляет отчет, который сдает преподавателю.

Экзамен проводится в виде письменной контрольной работы. На ответ и решение задачи студенту отводится 90 минут. Общее количество баллов получаемое студентами может быть 100. Перевод баллов в оценку: 91-100 баллов – «отлично», 81-90 баллов – «хорошо», 61-80 баллов – «удовлетворительно», 0-60 баллов – «неудовлетворительно».